Amistar Top

FORGALOMBAN

UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS: 2026.06.23

GOMBAÖLŐ SZER
NÖVÉNYVÉDŐ SZER

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig)

Kiszerelés: 1 l, 250 ml

Hatóanyagtartalom: 200 g/l azoxistrobin + 125 g/l difenokonazol

Hatóanyagcsoport: strubilurinok, triazolok

Formuláció: SC (vizes szuszpenzió koncentrátum)

Környezeti besorolás: Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség nem jelölésköteles.

Forgalmazási kategória: Forgalmi kategória: II. (250 ml), I. (1 l)

Termékismertető

FIGYELEM! A készítmény forgalmi kategóriája a vonatkozó okirat módosítás szerint megváltozott. 1 literes kiszerelés: I. forgalmi kategória. 250 ml-es kiszerelés: II. forgalmi kategória.

A permetlé mennyiségét a művelésmódtól, a védendő növényfelület nagyságától, és az alkalmazott növényvédelmi berendezés típusától függően kell megválasztani.

Hatásmechanizmus: azoxistrobin: sejtlégzés gátló hatóanyag (FRAC kód: 11). difenokonazol: szterol bioszintézis gátló hatóanyag (FRAC kód: 3)

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS

Kultúra	Kórokozó	Dózis	É.V.I.
paradicsom (hajtatott)	fitoftórás, alternáriás, szeptóriás, kladospóriumos betegség, szürkepenész,	0,6–1,0 l/ha	7 nap
paprika (hajtatott)	kolletotrihumos, alternáriás betegség, paprikaliszharmat, szürkepenész	0,6–1,0 l/ha	3 nap
padlizsán (tojásgyümölcs) (hajtatott)	szürkepenész, fitoftórás-, alternáriás betegség, liszharmat	0,6–1,0 l/ha	3 nap
káposztafélék - fejes káposzta, bimbós kel	káposztaperonoszpóra, alternáriás, plenodómuszos betegség, liszharmat	0,6–1,0 l/ha	21 nap
kelkáposzta, kínai kel, karfiol, brokkoli	káposztaperonoszpóra, alternáriás, plenodómuszos betegség, liszharmat	0,6–1,0 l/ha	14 nap
gyökérzöldségek (sárgarépa, petrezselyem, gumós zeller, cékla)	peronoszpóra, liszharmat, rozsda, alternáriás, szeptóriás betegség, cerkospórás	0,6–1,0 l/ha	14 nap

	levélfoltosság		
spárga	spárgarozsda	0,6–1,0 l/ha	előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás (a kezelés a spárgacsíkok betakarítása után történik)
póréhagyma	alternáriás betegség, szürkepenész	0,6–1,0 l/ha	21 nap
vöröshagyma, fokhagyma	peronoszpóra, alternáriás betegség, szürkepenész	1,0 l/ha	14 nap
újhagyma	alternáriás betegség, hagymarozsda, peronoszpóra, szürkepenész	1,0 l/ha	7 nap
mogyoróhagyma	alternáriás betegség, hagymarozsda, peronoszpóra, szürkepenész	1,0 l/ha	14 nap
zöldborsó	lisztharmat, peronoszpóra, rozsda, aszkohitás betegség	1,0 l/ha	14 nap
petrezselyem (levél), zeller (levél), kapor (levél), koriander	peronoszpóra, lisztharmat, szeptória, szürkepenész, fehérpenész	1,0 l/ha	14 nap
torma	albugós betegség, cerkospóra, lisztharmat	0,6-1,0 l/ha	21 nap
édeskömény	lisztharmat, passzalórás betegség	0,6-1,0	14 nap
spenót, sóska	lisztharmat, peronoszpóra, rozsda	0,6-1,0 l/ha	14 nap

salátafélék (fejes saláta, borsmustár (rukkola) (szabadföldi, hajtatott)	peronoszpóra, szürkepenész, fehérpenész	0,8-1,0 l/ha	14 nap
articsóka (szabadföldi)	lisztharmat, szürkepenész	0,8-1,0 l/ha	7 nap
cukkini	lisztharmat, peronoszpóra, kladospóriumos betegség	0,8-1,0 l/ha	3 nap
sárgadinnye, sütőtök, spárgatök (szabadföldi) (hajtatott)	lisztharmat, peronoszpóra, kladospóriumos betegség	0,8-1,0 l/ha	3 nap
szamóca (szabadföldi) (hajtatott)	lisztharmat, gnomóniás betegség, mikoszferellás levélfoltosság, antraknózis	1,0 l/ha	3 nap
díszfák, díszcserjék és dísznövények	lisztharmat, peronoszpóra, alternária, rozsda, apiognomónia, guignardia, varasodás	0,6-1,0 l/ha	előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges
csicsóka	lisztharmat, fehérpenész	0,8-1,0 l/ha	42 nap
gyógy- és fűszernövények (kamilla, máriatövis, orbáncfű, cickafark, gyűszűvirág, körömvirág, vasfű, orvosi csucsor, macskagyökér, levendula, konyhakömény, ánizs)	peronoszpóra, lisztharmat, rozsda, fehérpenész, alternáriás-, szeptóriás-, fómás betegség	0,6-1,0 l/ha	14 nap
rizs	pirikuláriás barnulás, bipolárizos levélfoltosság (helmintosporiózis)	0,8-1,0 l/ha	35 nap

édesburgonya	lisztharmat	1,0 l/ha	14 nap
Kiskultúrás felhasználások a 1107/2009 EK rendelet 51. cikke alapján. A felhasználások nincsenek alátámasztva dél-keleti EPPO zónás biológiai hatékonysági és a kultúrnövényre szelektivitási vizsgálatokkal. A készítmény kijuttatása ezekben a kultúrákban kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.			
vajrépa	albugós betegség, lisztharmat, alternáriás betegség, szklerotíniás betegség (fehérpenész)	0,6-1,0 l/ha	14 nap
tárkony	rozsda, lisztharmat, szeptóriás betegség, fómás betegség	0,6-1,0 l/ha	14 nap

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Engedélyezett felhasználás

Articsóka (szabadföldi)

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. háromszor használható fel. Kijuttatás időpontja: szárbaindulás kezdetétől (BBCH 30) virágzatfejlődésig (BBCH 55)

Kezelések közötti min. időtartam:

10 nap

Lisztharmat

Dózis: 0,8–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: szárbaindulás kezdetétől (BBCH 30) virágzatfejlődésig (BBCH 55)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 7 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Articsókában a gombaölő szert lisztharmat és szürkepenész ellen lehet felhasználni egy vegetációban összesen 3 alkalommal. A permetezéseket preventív módon, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell elvégezni. A készítményt 300–1000 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Magyarország

Szürkepenész (Botrytis cinerea)

Dózis: 0,8–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: szárbaindulás kezdetétől (BBCH 30) virágzatfejlődésig (BBCH 55)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 7 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Articsókában a gombaölő szert lisztharmat és szürkepenész ellen lehet felhasználni egy vegetációban összesen 3 alkalommal. A permetezéseket preventív módon, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell elvégezni. A készítményt 300–1000 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Bimbóskel

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. kétszer használható fel. Kijuttatás időpontja: fejesedés kezdetétől (BBCH 41) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49).

Kezelések közötti min. időtartam:

14 nap

Alternáriás betegség

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: fejesedés kezdetétől (BBCH 41) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 21 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Káposztafélékben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 500-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Káposztaperonoszpóra

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: fejesedés kezdetétől (BBCH 41) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 21 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Káposztafélékben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 500-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Lisztharmat

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: fejesedés kezdetétől (BBCH 41) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 21 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Káposztafélékben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 500-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Plenodómuszos betegség

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: fejesedés kezdetétől (BBCH 41) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 21 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Káposztafélékben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 500-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Brokkoli

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. kétszer használható fel. Kijuttatás időpontja: fejesedés kezdetétől (BBCH 41) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49).

Kezelések közötti min. időtartam:

14 nap

Alternáriás betegség

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: fejesedés kezdetétől (BBCH 41) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Káposztafélékben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 500-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Káposztaperonoszpóra

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: fejesedés kezdetétől (BBCH 41) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Káposztafélékben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 500-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Lisztharmat

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: fejesedés kezdetétől (BBCH 41) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Káposztafélékben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 500-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Plenodómuszos betegség

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: fejesedés kezdetétől (BBCH 41) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Káposztafélékben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 500-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Csicsóka

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. kétszer használható fel. Kijuttatás időpontja: harmadik levélpár kifejlődésétől (BBCH 13) virágzás végéig (BBCH 69).

Kezelések közötti min. időtartam:

14 nap

Fehérpenész

Dózis: 0,8-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: harmadik levélpár kifejlődésétől (BBCH 13) virágzás végéig (BBCH 69)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 42 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Csicsókában a gombaölő szer lisztharmat és fehérpenész ellen használható fel. A permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell megkezdeni. A készítményt 300–600 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Lisztharmat

Dózis: 0,8-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: harmadik levélpár kifejlődésétől (BBCH 13) virágzás végéig (BBCH 69)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 42 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Csicsókában a gombaölő szer lisztharmat és fehérpenész ellen használható fel. A permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell megkezdeni. A készítményt 300–600 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Cukkini (szabadföldi, hajtatott)

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. kétszer használható fel. Kijuttatás időpontja: első elsődleges oldalhajtás növekedésétől (BBCH 21) teljes érésig (BBCH 89).

Kezelések közötti min. időtartam:

10 nap

Kladospóriumos betegség

Dózis: 0,8–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: első elsődleges oldalhajtás növekedésétől (BBCH 21) teljes érésig (BBCH 89)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 3 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Sárgadinnyében, cukkiniben, sütőtökben és spárgatökben a készítményt a betegségek ellen megelőző jelleggel, más gombaölő szerekkel váltogatva kell felhasználni. A készítményt 500–800 l/ha (szabadföldi), 500–1200 l/ha (hajtatott) lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Lisztharmat

Dózis: 0,8–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: első elsődleges oldalhajtás növekedésétől (BBCH 21) teljes érésig (BBCH 89)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 3 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Sárgadinnyében, cukkiniben, sütőtökben és spárgatökben a készítményt a betegségek ellen megelőző jelleggel, más gombaölő szerekkel váltogatva kell felhasználni. A készítményt 500–800 l/ha (szabadföldi), 500–1200 l/ha (hajtatott) lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Peronoszpóra

Dózis: 0,8–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: első elsődleges oldalhajtás növekedésétől (BBCH 21) teljes érésig (BBCH 89)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 3 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Sárgadinnyében, cukkiniben, sütőtökben és spárgatökben a készítményt a betegségek ellen megelőző jelleggel, más gombaölő szerekkel váltogatva kell felhasználni. A készítményt 500–800 l/ha (szabadföldi), 500–1200 l/ha (hajtatott) lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Cékla

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. kétszer használható fel. Kijuttatás időpontja: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49)

Kezelések közötti min. időtartam:

14 nap

Alternáriás betegség

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Gyökérzöldségekben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Cerkospórás levélfoltosság

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Gyökérzöldségekben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Lisztharmat

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Gyökérzöldségekben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Peronoszpóra

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Gyökérzöldségekben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Rozsda

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Gyökérzöldségekben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Szeptóriás betegség

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Gyökérzöldségekben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Díszfák, díszcserjék

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. kétszer használható fel. Kijuttatás időpontja: nincs korlátozás.

Kezelések közötti min. időtartam:

10 nap

Alternária

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: nincs korlátozás

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Díszfák, díszcserjék és dísznövények gombás betegségei ellen a gombaölő szer 0,6-1,0 l/ha-os dózisban használható fel. A permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek kialakulása után kell elkezdeni. Szükség esetén a kezelést 10-14 nap múlva meg lehet ismételni. Erős fertőzési nyomás esetén a magasabb dózis használata javasolt. A készítményt 800–1500 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Apiognomónia

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: nincs korlátozás

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Díszfák, díszcserjék és dísznövények gombás betegségei ellen a gombaölő szer 0,6-1,0 l/ha-os dózisban használható fel. A permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek kialakulása után kell elkezdeni. Szükség esetén a kezelést 10-14 nap múlva meg lehet ismételni. Erős fertőzési nyomás esetén a magasabb dózis használata javasolt. A készítményt 800–1500 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Guignardia

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: nincs korlátozás

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Díszfák, díszcserjék és dísznövények gombás betegségei ellen a gombaölő szer 0,6-1,0 l/ha-os dózisban használható fel. A permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek kialakulása után kell elkezdeni. Szükség esetén a kezelést 10-14 nap múlva meg lehet ismételni. Erős fertőzési nyomás esetén a magasabb dózis használata javasolt. A készítményt 800–1500 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Lisztharmat

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: nincs korlátozás

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Díszfák, díszcserjék és dísznövények gombás betegségei ellen a gombaölő szer 0,6-1,0 l/ha-os dózisban használható fel. A permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek kialakulása után kell elkezdeni. Szükség esetén a kezelést 10-14 nap múlva meg lehet ismételni. Erős fertőzési nyomás esetén a magasabb dózis használata javasolt. A készítményt 800–1500 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Peronoszpóra

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: nincs korlátozás

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Díszfák, díszcserjék és dísznövények gombás betegségei ellen a gombaölő szer 0,6-1,0 l/ha-os dózisban használható fel. A permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek kialakulása után kell elkezdeni. Szükség esetén a kezelést 10-14 nap múlva meg lehet ismételni. Erős fertőzési nyomás esetén a magasabb dózis használata javasolt. A készítményt 800–1500 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Rozsda

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: nincs korlátozás

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Díszfák, díszcserjék és dísznövények gombás betegségei ellen a gombaölő szer 0,6-1,0 l/ha-os dózisban használható fel. A permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek kialakulása után kell elkezdeni. Szükség esetén a kezelést 10-14 nap múlva meg lehet ismételni. Erős fertőzési nyomás esetén a magasabb dózis használata javasolt. A készítményt 800–1500 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Varasodás

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: nincs korlátozás

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Díszfák, díszcserjék és dísznövények gombás betegségei ellen a gombaölő szer 0,6-1,0 l/ha-os dózisban használható fel. A permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek kialakulása után kell elkezdeni. Szükség esetén a kezelést 10-14 nap múlva meg lehet ismételni. Erős fertőzési nyomás esetén a magasabb dózis használata javasolt. A készítményt 800–1500 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Dísznövények

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. kétszer használható fel. Kijuttatás időpontja: nincs korlátozás.

Kezelések közötti min. időtartam:

10 nap

Alternária

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: nincs korlátozás

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Díszfák, díszcserjék és dísznövények gombás betegségei ellen a gombaölő szer 0,6-1,0 l/ha-os dózisban használható fel. A permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek kialakulása után kell elkezdeni. Szükség esetén a kezelést 10-14 nap múlva meg lehet ismételni. Erős fertőzési nyomás esetén a magasabb dózis használata javasolt. A készítményt 800–1500 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Apiognomónia

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: nincs korlátozás

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Díszfák, díszcserjék és dísznövények gombás betegségei ellen a gombaölő szer 0,6-1,0 l/ha-os dózisban használható fel. A permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek kialakulása után kell elkezdeni. Szükség esetén a kezelést 10-14 nap múlva meg lehet ismételni. Erős fertőzési nyomás esetén a magasabb dózis használata javasolt. A készítményt 800–1500 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Guignardia

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: nincs korlátozás

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Díszfák, díszcserjék és dísznövények gombás betegségei ellen a gombaölő szer 0,6-1,0 l/ha-os dózisban használható fel. A permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek kialakulása után kell elkezdeni. Szükség esetén a kezelést 10-14 nap múlva meg lehet ismételni. Erős fertőzési nyomás esetén a magasabb dózis használata javasolt. A készítményt 800–1500 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Lisztharmat

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: nincs korlátozás

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Díszfák, díszcserjék és dísznövények gombás betegségei ellen a gombaölő szer 0,6-1,0 l/ha-os dózisban használható fel. A permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek kialakulása után kell elkezdeni. Szükség esetén a kezelést 10-14 nap múlva meg lehet ismételni. Erős fertőzési nyomás esetén a magasabb dózis használata javasolt. A készítményt 800–1500 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Peronoszpóra

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: nincs korlátozás

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Díszfák, díszcserjék és dísznövények gombás betegségei ellen a gombaölő szer 0,6-1,0 l/ha-os dózisban használható fel. A permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek kialakulása után kell elkezdeni. Szükség esetén a kezelést 10-14 nap múlva meg lehet ismételni. Erős fertőzési nyomás esetén a magasabb dózis használata javasolt. A készítményt 800–1500 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Rozsda

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: nincs korlátozás

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Díszfák, díszcserjék és dísznövények gombás betegségei ellen a gombaölő szer 0,6-1,0 l/ha-os dózisban használható fel. A permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek kialakulása után kell elkezdeni. Szükség esetén a kezelést 10-14 nap múlva meg lehet ismételni. Erős fertőzési nyomás esetén a magasabb dózis használata javasolt. A készítményt 800–1500 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Varasodás

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: nincs korlátozás

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Díszfák, díszcserjék és dísznövények gombás betegségei ellen a gombaölő szer 0,6-1,0 l/ha-os dózisban használható fel. A permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek kialakulása után kell elkezdeni. Szükség esetén a kezelést 10-14 nap múlva meg lehet ismételni. Erős fertőzési nyomás esetén a magasabb dózis használata javasolt. A készítményt 800–1500 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Fejes káposzta

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. kétszer használható fel. Kijuttatás időpontja: fejesedés kezdetétől (BBCH 41) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49).

Kezelések közötti min. időtartam:

14 nap

Alternáriás betegség

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: fejesedés kezdetétől (BBCH 41) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 21 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Káposztafélékben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 500-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Káposztaperonoszpóra

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: fejesedés kezdetétől (BBCH 41) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 21 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Káposztafélékben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 500-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Lisztharmat

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: fejesedés kezdetétől (BBCH 41) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 21 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Káposztafélékben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 500-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Plenodómuszos betegség

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: fejesedés kezdetétől (BBCH 41) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 21 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Káposztafélékben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 500-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Fejes saláta (szabadföldi, hajtatott)

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. kétszer használható fel. Kijuttatás időpontja: 6 leveles állapottól (BBCH 16) végleges fejméret vagy végső levéltömeg eléréséig (BBCH 49).

Kezelések közötti min. időtartam:

7 nap

Fehérpenész

Dózis: 0,8–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: 6 leveles állapottól (BBCH 16) végleges fejméret vagy végső levéltömeg eléréséig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Salátafélékben a gombaölő szer peronoszpóra, fehérpenész és szürkepenész ellen használható fel 6 leveles állapottól. A permetezéseket megelőző jelleggel kell megkezdeni. A készítményt 300–800 l/ha (szabadföldi), 300–1200 l/ha (hajtatott) lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Peronoszpóra

Dózis: 0,8–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: 6 leveles állapottól (BBCH 16) végleges fejméret vagy végső levéltömeg eléréséig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Salátafélékben a gombaölő szer peronoszpóra, fehérpenész és szürkepenész ellen használható fel 6 leveles állapottól. A permetezéseket megelőző jelleggel kell megkezdeni. A készítményt 300–800 l/ha (szabadföldi), 300–1200 l/ha (hajtatott) lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Szürkepenész (Botrytis cinerea)

Dózis: 0,8–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: 6 leveles állapottól (BBCH 16) végleges fejméret vagy végső levéltömeg eléréséig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Salátafélékben a gombaölő szer peronoszpóra, fehérpenész és szürkepenész ellen használható fel 6 leveles állapottól. A permetezéseket megelőző jelleggel kell megkezdeni. A készítményt 300–800 l/ha (szabadföldi), 300–1200 l/ha (hajtatott) lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Fokhagyma

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. kétszer használható fel. Kijuttatás időpontja: Négyleveles állapottól (BBCH 14) 50 %-os fejátmérőeléréséig (BBCH 45).

Kezelések közötti min. időtartam:

14 nap

Alternária

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: négyleveles állapottól (BBCH 14) 50 %-os fejátmérőeléréséig (BBCH 45)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Hagymafélékben peronoszpóra, alternária és szürkepenész ellen a permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű megkezdeni, majd a fertőzés erősségétől függően 14 nap elteltével megismételni. A készítményt 400–600 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Peronoszpóra

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: négyleveles állapottól (BBCH 14) 50 %-os fejátmérőeléréséig (BBCH 45)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Hagymafélékben peronoszpóra, alternária és szürkepenész ellen a permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű megkezdeni, majd a fertőzés erősségétől függően 14 nap elteltével megismételni. A készítményt 400–600 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Szürkepenész (Botrytis cinerea)

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: négyleveles állapottól (BBCH 14) 50 %-os fejátmérőeléréséig (BBCH 45)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Hagymafélékben peronoszpóra, alternária és szürkepenész ellen a permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű megkezdeni, majd a fertőzés erősségétől függően 14 nap elteltével megismételni. A készítményt 400–600 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Gyógy- és fűszernövények

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. kétszer használható fel. Kijuttatás időpontja: Négyleveles állapottól (BBCH 14) 14 nappal betakarítás előtti állapotig.

Kezelések közötti min. időtartam:

14 nap

Alternária

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: négyleveles állapottól (BBCH 14) 14 nappal betakarítás előtti állapotig

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Gyógy- és fűszernövényekben (macskagyökér, kamilla, orvosi csucsor, körömvirág, orbáncfű, máriatövis, levendula, gyapjas gyűszűvirág, cickafark, vasfű, konyhakömény, ánizs,) peronoszpóra, lisztharmat, rozsda, fehérpenész valamint az alternáriás-, szeptóriás- és fómás betegségek ellen a gombaölő szert megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell felhasználni. A készítményt 250–500 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Fehérpenész

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: négyleveles állapottól (BBCH 14) 14 nappal betakarítás előtti állapotig

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Gyógy- és fűszernövényekben (macskagyökér, kamilla, orvosi csucsor, körömvirág, orbáncfű, máriatövis, levendula, gyapjas gyűszűvirág, cickafark, vasfű, konyhakömény, ánizs,) peronoszpóra, lisztharmat, rozsda, fehérpenész valamint az alternáriás-, szeptóriás- és fómás betegségek ellen a gombaölő szert megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell felhasználni. A készítményt 250–500 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Fóma

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: négyleveles állapottól (BBCH 14) 14 nappal betakarítás előtti állapotig

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Gyógy- és fűszernövényekben (macskagyökér, kamilla, orvosi csucsor, körömvirág, orbáncfű, máriatövis, levendula, gyapjas gyűszűvirág, cickafark, vasfű, konyhakömény, ánizs,) peronoszpóra, lisztharmat, rozsda, fehérpenész valamint az alternáriás-, szeptóriás- és fómás betegségek ellen a gombaölő szert megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell felhasználni. A készítményt 250–500 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Lisztharmat

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: négyleveles állapottól (BBCH 14) 14 nappal betakarítás előtti állapotig

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Gyógy- és fűszernövényekben (macskagyökér, kamilla, orvosi csucsor, körömvirág, orbáncfű, máriatövis, levendula, gyapjas gyűszűvirág, cickafark, vasfű, konyhakömény, ánizs,) peronoszpóra, lisztharmat, rozsda, fehérpenész valamint az alternáriás-, szeptóriás- és fómás betegségek ellen a gombaölő szert megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell felhasználni. A készítményt 250–500 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Peronoszpóra

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: négyleveles állapottól (BBCH 14) 14 nappal betakarítás előtti állapotig

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Gyógy- és fűszernövényekben (macskagyökér, kamilla, orvosi csucsor, körömvirág, orbáncfű, máriatövis, levendula, gyapjas gyűszűvirág, cickafark, vasfű, konyhakömény, ánizs,) peronoszpóra, lisztharmat, rozsda, fehérpenész valamint az alternáriás-, szeptóriás- és fómás betegségek ellen a gombaölő szert megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell felhasználni. A készítményt 250–500 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Rozsda

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: négyleveles állapottól (BBCH 14) 14 nappal betakarítás előtti állapotig

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Gyógy- és fűszernövényekben (macskagyökér, kamilla, orvosi csucsor, körömvirág, orbáncfű, máriatövis, levendula, gyapjas gyűszűvirág, cickafark, vasfű, konyhakömény, ánizs,) peronoszpóra, lisztharmat, rozsda, fehérpenész valamint az alternáriás-, szeptóriás- és fómás betegségek ellen a gombaölő szert megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell felhasználni. A készítményt 250–500 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Szeptória

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: négyleveles állapottól (BBCH 14) 14 nappal betakarítás előtti állapotig

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Gyógy- és fűszernövényekben (macskagyökér, kamilla, orvosi csucsor, körömvirág, orbáncfű, máriatövis, levendula, gyapjas gyűszűvirág, cickafark, vasfű, konyhakömény, ánizs,) peronoszpóra, lisztharmat, rozsda, fehérpenész valamint az alternáriás-, szeptóriás- és fómás betegségek ellen a gombaölő szert megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell felhasználni. A készítményt 250–500 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Kaporlevél

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. kétszer használható fel. Kijuttatás időpontja: 10 %-os levéltömeg elérésétől (BBCH 41) 80 %-os levéltömeg eléréséig (BBCH 48) .

Kezelések közötti min. időtartam:

14 nap

Fehérpenész

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: 10 %-os levéltömeg elérésétől (BBCH 41) 80 %-os levéltömeg eléréséig (BBCH 48)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Levélpetrezselyemben, levélzellerben, kaporban és korianderben a permetezéseket megelőző jelleggel, vagy az első tünetek megjelenésekor kell elkezdeni. A kezeléseket 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel kell elvégezni.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Lisztharmat

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: 10 %-os levéltömeg elérésétől (BBCH 41) 80 %-os levéltömeg eléréséig (BBCH 48)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Levélpetrezselyemben, levélzellerben, kaporban és korianderben a permetezéseket megelőző jelleggel, vagy az első tünetek megjelenésekor kell elkezdeni. A kezeléseket 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel kell elvégezni.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Peronoszpóra

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: 10 %-os levéltömeg elérésétől (BBCH 41) 80 %-os levéltömeg eléréséig (BBCH 48)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Levélpetrezselyemben, levélzellerben, kaporban és korianderben a permetezéseket megelőző jelleggel, vagy az első tünetek megjelenésekor kell elkezdeni. A kezeléseket 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel kell elvégezni.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Szeptóriás betegség

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: 10 %-os levéltömeg elérésétől (BBCH 41) 80 %-os levéltömeg eléréséig (BBCH 48)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Levélpetrezselyemben, levélzellerben, kaporban és korianderben a permetezéseket megelőző jelleggel, vagy az első tünetek megjelenésekor kell elkezdeni. A kezeléseket 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel kell elvégezni.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Szürkepenész (Botrytis cinerea)

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: 10 %-os levéltömeg elérésétől (BBCH 41) 80 %-os levéltömeg eléréséig (BBCH 48)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Levélpetrezselyemben, levélzellerben, kaporban és korianderben a permetezéseket megelőző jelleggel, vagy az első tünetek megjelenésekor kell elkezdeni. A kezeléseket 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel kell elvégezni.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Karfiol

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. kétszer használható fel. Kijuttatás időpontja: Fejesedés kezdetétől (BBCH 41) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49).

Kezelések közötti min. időtartam:

14 nap

Alternáriás betegség

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: fejesedés kezdetétől (BBCH 41) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Káposztafélékben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 500-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Káposztaperonoszpóra

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: fejesedés kezdetétől (BBCH 41) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Káposztafélékben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 500-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Lisztharmat

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: fejesedés kezdetétől (BBCH 41) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Káposztafélékben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 500-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Plenodómuszos betegség

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: fejesedés kezdetétől (BBCH 41) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Káposztafélékben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 500-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Kelkáposzta

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. kétszer használható fel. Kijuttatás időpontja: fejesedés kezdetétől (BBCH 41) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49).

Kezelések közötti min. időtartam:

14 nap

Alternáriás betegség

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: fejesedés kezdetétől (BBCH 41) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Káposztafélékben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 500-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Káposztaperonoszpóra

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: fejesedés kezdetétől (BBCH 41) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Káposztafélékben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 500-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Lisztharmat

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: fejesedés kezdetétől (BBCH 41) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Káposztafélékben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 500-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Plenodómuszos betegség

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: fejesedés kezdetétől (BBCH 41) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Káposztafélékben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 500-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Koriander

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. kétszer használható fel. Kijuttatás időpontja: 10 %-os levéltömeg elérésétől (BBCH 41) 80 %-os levéltömeg eléréséig (BBCH 48).

Kezelések közötti min. időtartam:

14 nap

Fehérpenész

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: 10 %-os levéltömeg elérésétől (BBCH 41) 80 %-os levéltömeg eléréséig (BBCH 48)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Levélpetrezselyemben, levélzellerben, kaporban és korianderben a permetezéseket megelőző jelleggel, vagy az első tünetek megjelenésekor kell elkezdeni. A kezeléseket 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel kell elvégezni.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Lisztharmat

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: 10 %-os levéltömeg elérésétől (BBCH 41) 80 %-os levéltömeg eléréséig (BBCH 48)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Levélpetrezselyemben, levélzellerben, kaporban és korianderben a permetezéseket megelőző jelleggel, vagy az első tünetek megjelenésekor kell elkezdeni. A kezeléseket 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel kell elvégezni.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Peronoszpóra

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: 10 %-os levéltömeg elérésétől (BBCH 41) 80 %-os levéltömeg eléréséig (BBCH 48)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Levélpetrezselyemben, levélzellerben, kaporban és korianderben a permetezéseket megelőző jelleggel, vagy az első tünetek megjelenésekor kell elkezdeni. A kezeléseket 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel kell elvégezni.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Szeptóriás betegség

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: 10 %-os levéltömeg elérésétől (BBCH 41) 80 %-os levéltömeg eléréséig (BBCH 48)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Levélpetrezselyemben, levélzellerben, kaporban és korianderben a permetezéseket megelőző jelleggel, vagy az első tünetek megjelenésekor kell elkezdeni. A kezeléseket 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel kell elvégezni.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Szürkepenész (Botrytis cinerea)

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: 10 %-os levéltömeg elérésétől (BBCH 41) 80 %-os levéltömeg eléréséig (BBCH 48)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Levélpetrezselyemben, levélzellerben, kaporban és korianderben a permetezéseket megelőző jelleggel, vagy az első tünetek megjelenésekor kell elkezdeni. A kezeléseket 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel kell elvégezni.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Kínai kel

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. kétszer használható fel. Kijuttatás időpontja: fejesedés kezdetétől (BBCH 41) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49).

Kezelések közötti min. időtartam:

14 nap

Alternáriás betegség

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: fejesedés kezdetétől (BBCH 41) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Káposztafélékben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 500-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Káposztaperonoszpóra

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: fejesedés kezdetétől (BBCH 41) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Káposztafélékben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 500-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Lisztharmat

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: fejesedés kezdetétől (BBCH 41) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Káposztafélékben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 500-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Plenodómuszos betegség

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: fejesedés kezdetétől (BBCH 41) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Káposztafélékben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 500-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Mogyoróhagyma (szabadföldi)

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. háromszor használható fel. Kijuttatás időpontja: négyleveles állapottól (BBCH 14) 50 %-os fejátmérő eléréséig (BBCH 45).

Kezelések közötti min. időtartam:

14 nap

Alternária

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: négyleveles állapottól (BBCH 14) 50 %-os fejátmérő eléréséig (BBCH 45)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Hagymafélékben peronoszpóra, alternária és szürkepenész ellen a permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű megkezdeni, majd a fertőzés erősségétől függően 14 nap elteltével megismételni.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Peronoszpóra

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: négyleveles állapottól (BBCH 14) 50 %-os fejátmérő eléréséig (BBCH 45)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Hagymafélékben peronoszpóra, alternária és szürkepenész ellen a permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű megkezdeni, majd a fertőzés erősségétől függően 14 nap elteltével megismételni.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Rozsda

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: négyleveles állapottól (BBCH 14) 50 %-os fejátmérő eléréséig (BBCH 45)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Hagymafélékben peronoszpóra, alternária és szürkepenész ellen a permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű megkezdeni, majd a fertőzés erősségétől függően 14 nap elteltével megismételni.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Szürkepenész (Botrytis cinerea)

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: négyleveles állapottól (BBCH 14) 50 %-os fejátmérő eléréséig (BBCH 45)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Hagymafélékben peronoszpóra, alternária és szürkepenész ellen a permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű megkezdeni, majd a fertőzés erősségétől függően 14 nap elteltével megismételni.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Padlizsán (tojásgyümölcs, hajtatott)

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. háromszor használható fel. Kijuttatás időpontja: első elsődleges oldalhajtás képződésétől (BBCH 21) teljes érésig (BBCH 89).

Kezelések közötti min. időtartam:

7 nap

Alternáriás betegség

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: első elsődleges oldalhajtás képződésétől (BBCH 21) teljes érésig (BBCH 89)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 3 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Tojásgyümölcsben a kórokozók fertőzési veszélyétől függően az oldalhajtások képződésétől érésig 7-10 naponta, 500-1000 l/ha vízmennyiséggel jutassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Fitoftórás betegség

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: első elsődleges oldalhajtás képződésétől (BBCH 21) teljes érésig (BBCH 89)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 3 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Tojásgyümölcsben a kórokozók fertőzési veszélyétől függően az oldalhajtások képződésétől érésig 7-10 naponta, 500-1000 l/ha vízmennyiséggel jutassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Lisztharmat

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: első elsődleges oldalhajtás képződésétől (BBCH 21) teljes érésig (BBCH 89)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 3 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Tojásgyümölcsben a kórokozók fertőzési veszélyétől függően az oldalhajtások képződésétől érésig 7-10 naponta, 500-1000 l/ha vízmennyiséggel jutassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Szürkepenész (Botrytis cinerea)

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: első elsődleges oldalhajtás képződésétől (BBCH 21) teljes érésig (BBCH 89)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 3 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Tojásgyümölcsben a kórokozók fertőzési veszélyétől függően az oldalhajtások képződésétől érésig 7-10 naponta, 500-1000 l/ha vízmennyiséggel jutassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Paprika (hajtatott)

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. háromszor használható fel. Kijuttatás időpontja: bimbófejlődés kezdetétől (BBCH 51) terméskötődésig (BBCH 70).

Kezelések közötti min. időtartam:

8 nap

Alternáriás betegség

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: bimbófejlődés kezdetétől (BBCH 51) terméskötődésig (BBCH 70)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 3 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Paprikában a virágzás kezdetén, fővirágzásban és virágzás végén (8-10 naponta) 600-1000 l/ha vízmennyiséggel.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Kolletotrihumos betegség

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: bimbófejlődés kezdetétől (BBCH 51) terméskötődésig (BBCH 70)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 3 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Paprikában a virágzás kezdetén, fővirágzásban és virágzás végén (8-10 naponta) 600-1000 l/ha vízmennyiséggel.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Paprikaliszharmat

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: bimbófejlődés kezdetétől (BBCH 51) terméskötődésig (BBCH 70)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 3 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Paprikában a virágzás kezdetén, fővirágzásban és virágzás végén (8-10 naponta) 600-1000 l/ha vízmennyiséggel.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Szürkepenész (Botrytis cinerea)

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: bimbófejlődés kezdetétől (BBCH 51) terméskötődésig (BBCH 70)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 3 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Paprikában a virágzás kezdetén, fővirágzásban és virágzás végén (8-10 naponta) 600-1000 l/ha vízmennyiséggel.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Paradicsom (hajtatott)

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. háromszor használható fel. Kijuttatás időpontja: első elsődleges oldalhajtás képződésétől (BBCH 21) teljes érésig (BBCH 89).

Kezelések közötti min. időtartam:

8 nap

Alternária

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: első elsődleges oldalhajtás képződésétől (BBCH 21) teljes érésig (BBCH 89)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 7 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Paradicsomban legkésőbb az első tünetek megjelenésekor 8-10 napos időközökkel, 400-600 l/ha vízmennyiséggel jutassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Fitoftóra

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: első elsődleges oldalhajtás képződésétől (BBCH 21) teljes érésig (BBCH 89)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 7 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Paradicsomban legkésőbb az első tünetek megjelenésekor 8-10 napos időközökkel, 400-600 l/ha vízmennyiséggel jutassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Kladospóriumos betegség

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: első elsődleges oldalhajtás képződésétől (BBCH 21) teljes érésig (BBCH 89)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 7 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Paradicsomban legkésőbb az első tünetek megjelenésekor 8-10 napos időközökkel, 400-600 l/ha vízmennyiséggel jutassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Szeptóriás betegség

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: első elsődleges oldalhajtás képződésétől (BBCH 21) teljes érésig (BBCH 89)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 7 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Paradicsomban legkésőbb az első tünetek megjelenésekor 8-10 napos időközökkel, 400-600 l/ha vízmennyiséggel jutassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Szürkepenész (Botrytis cinerea)

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: első elsődleges oldalhajtás képződésétől (BBCH 21) teljes érésig (BBCH 89)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 7 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Paradicsomban legkésőbb az első tünetek megjelenésekor 8-10 napos időközökkel, 400-600 l/ha vízmennyiséggel jutassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Petrezselyemgyökér

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. kétszer használható fel. Kijuttatás időpontja: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49).

Kezelések közötti min. időtartam:

14 nap

Alternáriás betegség

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Gyökérzöldségekben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Cerkospórás levélfoltosság

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Gyökérzöldségekben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Lisztharmat

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Gyökérzöldségekben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Peronoszpóra

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Gyökérzöldségekben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Rozsda

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Gyökérzöldségekben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Szeptóriás betegség

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Gyökérzöldségekben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Petrezselyemlevél

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. kétszer használható fel. Kijuttatás időpontja: 10 %-os levéltömeg elérésétől (BBCH 41) 80 %-os levéltömeg eléréséig (BBCH 48).

Kezelések közötti min. időtartam:

14 nap

Fehérpenész

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: 10 %-os levéltömeg elérésétől (BBCH 41) 80 %-os levéltömeg eléréséig (BBCH 48)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Levélpetrezselyemben, levélzellerben, kaporban és korianderben a permetezéseket megelőző jelleggel, vagy az első tünetek megjelenésekor kell elkezdeni. A kezeléseket 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel kell elvégezni.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Lisztharmat

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: 10 %-os levéltömeg elérésétől (BBCH 41) 80 %-os levéltömeg eléréséig (BBCH 48)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Levélpetrezselyemben, levélzellerben, kaporban és korianderben a permetezéseket megelőző jelleggel, vagy az első tünetek megjelenésekor kell elkezdeni. A kezeléseket 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel kell elvégezni.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Peronoszpóra

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: 10 %-os levéltömeg elérésétől (BBCH 41) 80 %-os levéltömeg eléréséig (BBCH 48)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Levélpetrezselyemben, levélzellerben, kaporban és korianderben a permetezéseket megelőző jelleggel, vagy az első tünetek megjelenésekor kell elkezdeni. A kezeléseket 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel kell elvégezni.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Szeptóriás betegség

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: 10 %-os levéltömeg elérésétől (BBCH 41) 80 %-os levéltömeg eléréséig (BBCH 48)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Levélpetrezselyemben, levélzellerben, kaporban és korianderben a permetezéseket megelőző jelleggel, vagy az első tünetek megjelenésekor kell elkezdeni. A kezeléseket 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel kell elvégezni.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Szürkepenész (Botrytis cinerea)

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: 10 %-os levéltömeg elérésétől (BBCH 41) 80 %-os levéltömeg eléréséig (BBCH 48)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Levélpetrezselyemben, levélzellerben, kaporban és korianderben a permetezéseket megelőző jelleggel, vagy az első tünetek megjelenésekor kell elkezdeni. A kezeléseket 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel kell elvégezni.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Póréhagyma

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. háromszor használható fel. Kijuttatás időpontja: négyleveles állapottól (BBCH 14) a fajtára jellemző 70%-os szárvastagság eléréséig (BBCH 47).

Kezelések közötti min. időtartam:

12 nap

Alternáriás betegség

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: négyleveles állapottól (BBCH 14) a fajtára jellemző 70%-os szárvastagság eléréséig (BBCH 47)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 21 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Póréhagymában a fertőzés észlelésétől 12 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel célszerű kijuttatni a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Szürkepenész (Botrytis cinerea)

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: négyleveles állapottól (BBCH 14) a fajtára jellemző 70%-os szárvastagság eléréséig (BBCH 47)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 21 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Póréhagymában a fertőzés észlelésétől 12 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel célszerű kijuttatni a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Rizs

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban legfeljebb kétszer használható fel. Kijuttatás időpontja: zászlós levél megjelenésétől (BBCH 41) teljes virágzásig (BBCH 65)

Kezelések közötti min. időtartam:

10 nap

Bipoláriszos levélfoltosság (helmintosporiózis)

Dózis: 0,8 – 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: zászlós levél megjelenésétől (BBCH 41) teljes virágzásig (BBCH 65)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 35 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Rizsben a betegségek elleni kezelést előrejelzésre alapozottan, megelőző jelleggel szükséges elvégezni a zászlóslevél megjelenése és a bugahányás kezdete közötti időszakban. A fertőzésre hajlamosító körülmények között a permetezést javasolt megismételni a bugák 50-75%-ának megjelenésekor. Nagy fertőzési nyomásban a nagyobb dózis kijuttatása indokolt. A készítményt 200–400 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: Kifejezetten kockázatos.

Pirikuláriás barnulás

Dózis: 0,8 – 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: zászlós levél megjelenésétől (BBCH 41) teljes virágzásig (BBCH 65)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 35 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Rizsben a betegségek elleni kezelést előrejelzésre alapozottan, megelőző jelleggel szükséges elvégezni a zászlóslevél megjelenése és a bugahányás kezdete közötti időszakban. A fertőzésre hajlamosító körülmények között a permetezést javasolt megismételni a bugák 50-75%-ának megjelenésekor. Nagy fertőzési nyomásban a nagyobb dózis kijuttatása indokolt. A készítményt 200–400 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: Kifejezetten kockázatos.

Rukkola (szabadföldi, hajtatott)

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. kétszer használható fel. Kijuttatás időpontja: 6 leveles állapottól (BBCH 16) végleges fejméret vagy végső levéltömeg eléréséig (BBCH 49).

Kezelések közötti min. időtartam:

7 nap

Fehérpenész

Dózis: 0,8–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: 6 leveles állapottól (BBCH 16) végleges fejméret vagy végső levéltömeg eléréséig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Salátafélékben a gombaölő szer peronoszpóra, fehérpenész és szürkepenész ellen használható fel 6 leveles állapottól. A permetezéseket megelőző jelleggel kell megkezdeni. A készítményt 300–800 l/ha (szabadföldi), 300–1200 l/ha (hajtatott) lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Peronoszpóra

Dózis: 0,8–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: 6 leveles állapottól (BBCH 16) végleges fejméret vagy végső levéltömeg eléréséig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Salátafélékben a gombaölő szer peronoszpóra, fehérpenész és szürkepenész ellen használható fel 6 leveles állapottól. A permetezéseket megelőző jelleggel kell megkezdeni. A készítményt 300–800 l/ha (szabadföldi), 300–1200 l/ha (hajtatott) lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Szürkepenész (Botrytis cinerea)

Dózis: 0,8–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: 6 leveles állapottól (BBCH 16) végleges fejméret vagy végső levéltömeg eléréséig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Salátafélékben a gombaölő szer peronoszpóra, fehérpenész és szürkepenész ellen használható fel 6 leveles állapottól. A permetezéseket megelőző jelleggel kell megkezdeni. A készítményt 300–800 l/ha (szabadföldi), 300–1200 l/ha (hajtatott) lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Spenót

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. háromszor használható fel. Kijuttatás időpontja: 10 %-os levéltömeg elérésétől (BBCH 41) 14 nappal betakarítás előtti állapotig.

Kezelések közötti min. időtartam:

12 nap

Lisztharmat

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: 10 %-os levéltömeg elérésétől (BBCH 41) 14 nappal betakarítás előtti állapotig

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Spenót és sóskában a permetezéseket a fertőzés helyzetétől függően maximum 3 alkalommal, 12-14 naponta, preventív módon kell elvégezni. A készítményt 400–600 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Peronoszpóra

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: 10 %-os levéltömeg elérésétől (BBCH 41) 14 nappal betakarítás előtti állapotig

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Spenót és sóskában a permetezéseket a fertőzés helyzetétől függően maximum 3 alkalommal, 12-14 naponta, preventív módon kell elvégezni. A készítményt 400–600 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Rozsda

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: 10 %-os levéltömeg elérésétől (BBCH 41) 14 nappal betakarítás előtti állapotig

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Spenót és sóskában a permetezéseket a fertőzés helyzetétől függően maximum 3 alkalommal, 12-14 naponta, preventív módon kell elvégezni. A készítményt 400–600 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Spárga

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. kétszer használható fel. Kijuttatás időpontja: spárgasípok szedését követően fillokládiumok sárgulása (BBCH 93).

Kezelések közötti min. időtartam:

14 nap

Spárgarozsda

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: spárgasípok szedését követően fillokládiumok sárgulása (BBCH 93)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás (a kezelés a spárgasípok betakarítása után történik)

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Spárgában a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 500-800 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Spárgatök

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. háromszor használható fel. Kijuttatás időpontja: első elsődleges oldalhajtás növekedésétől (BBCH 21) teljes érésig (BBCH 89).

Kezelések közötti min. időtartam:

10 nap

Kladospóriumos betegség

Dózis: 0,8–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: első elsődleges oldalhajtás növekedésétől (BBCH 21) teljes érésig (BBCH 89)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 3 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Sárgadinnyében, cukkiniben, sütőtökben és spárgatökben a készítményt a betegségek ellen megelőző jelleggel, más gombaölő szerekkel váltogatva kell felhasználni. A készítményt 500–800 l/ha (szabadföldi), 500–1200 l/ha (hajtatott) lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Lisztharmat

Dózis: 0,8–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: első elsődleges oldalhajtás növekedésétől (BBCH 21) teljes érésig (BBCH 89)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 3 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Sárgadinnyében, cukkiniben, sütőtökben és spárgatökben a készítményt a betegségek ellen megelőző jelleggel, más gombaölő szerekkel váltogatva kell felhasználni. A készítményt 500–800 l/ha (szabadföldi), 500–1200 l/ha (hajtatott) lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Peronoszpóra

Dózis: 0,8–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: első elsődleges oldalhajtás növekedésétől (BBCH 21) teljes érésig (BBCH 89)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 3 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Sárgadinnyében, cukkiniben, sütőtökben és spárgatökben a készítményt a betegségek ellen megelőző jelleggel, más gombaölő szerekkel váltogatva kell felhasználni. A készítményt 500–800 l/ha (szabadföldi), 500–1200 l/ha (hajtatott) lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Szamóca (szabadföldi, hajtott)

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. háromszor használható fel. Kijuttatás időpontja: az első virágok nyílásától (BBCH 60) egy héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86).

Kezelések közötti min. időtartam:

7 nap

Antraknózis

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: az első virágok nyílásától (BBCH 60) egy héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 3 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Szamócában lisztharmat, antraknózis (Colletotrichum acutatum) gnomóniás- valamint a levél-foltbetegségek ellen a permetezéseket megelőző jelleggel kell megkezdeni, melyet a fertőzési nyomástól függően 2 alkalommal meg lehet ismételni. A készítményt 300– 1200 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Gnomóniás betegség

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: az első virágok nyílásától (BBCH 60) egy héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 3 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Szamócában lisztharmat, antraknózis (Colletotrichum acutatum) gnomóniás- valamint a levél-foltbetegségek ellen a permetezéseket megelőző jelleggel kell megkezdeni, melyet a fertőzési nyomástól függően 2 alkalommal meg lehet ismételni. A készítményt 300– 1200 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Lisztharmat

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: az első virágok nyílásától (BBCH 60) egy héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 3 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Szamócában lisztharmat, antraknózis (Colletotrichum acutatum) gnomóniás- valamint a levél-foltbetegségek ellen a permetezéseket megelőző jelleggel kell megkezdeni, melyet a fertőzési nyomástól függően 2 alkalommal meg lehet ismételni. A készítményt 300– 1200 l/ha

lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Mikoszferellás levélfoltosság

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: az első virágok nyílásától (BBCH 60) egy héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 3 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Szamócában lisztharmat, antraknózis (Colletotrichum acutatum) gnomóniás- valamint a levél-foltbetegségek ellen a permetezéseket megelőző jelleggel kell megkezdeni, melyet a fertőzési nyomástól függően 2 alkalommal meg lehet ismételni. A készítményt 300– 1200 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Sárgadinnye (szabadföldi, hajtatott)

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. háromszor használható fel. Kijuttatás időpontja: első elsődleges oldalhajtás növekedésétől (BBCH 21) teljes érésig (BBCH 89).

Kezelések közötti min. időtartam:

10 nap

Kladospóriumos betegség

Dózis: 0,8–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: első elsődleges oldalhajtás növekedésétől (BBCH 21) teljes érésig (BBCH 89)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 3 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Sárgadinnyében, cukkiniben, sütőtökben és spárgatökben a készítményt a betegségek ellen megelőző jelleggel, más gombaölő szerekkel váltogatva kell felhasználni. A készítményt 500–800 l/ha (szabadföldi), 500–1200 l/ha (hajtatott) lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Lisztharmat

Dózis: 0,8–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: első elsődleges oldalhajtás növekedésétől (BBCH 21) teljes érésig (BBCH 89)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 3 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Sárgadinnyében, cukkiniben, sütőtökben és spárgatökben a készítményt a betegségek ellen megelőző jelleggel, más gombaölő szerekkel váltogatva kell felhasználni. A készítményt 500–800 l/ha (szabadföldi), 500–1200 l/ha (hajtatott) lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Peronoszpóra

Dózis: 0,8–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: első elsődleges oldalhajtás növekedésétől (BBCH 21) teljes érésig (BBCH 89)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 3 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Sárgadinnyében, cukkiniben, sütőtökben és spárgatökben a készítményt a betegségek ellen megelőző jelleggel, más gombaölő szerekkel váltogatva kell felhasználni. A készítményt 500–800 l/ha (szabadföldi), 500–1200 l/ha (hajtatott) lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Sárgarépa

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. kétszer használható fel. Kijuttatás időpontja: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49).

Kezelések közötti min. időtartam:

14 nap

Alternáriás betegség

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Gyökérzöldségekben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Lisztharmat

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Gyökérzöldségekben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Peronoszpóra

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Gyökérzöldségekben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Rozsda

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Gyökérzöldségekben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Szeptóriás betegség

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Gyökérzöldségekben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Sóska

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. háromszor használható fel. Kijuttatás időpontja: 10 %-os levéltömeg elérésétől (BBCH 41) 14 nappal betakarítás előtti állapotig.

Kezelések közötti min. időtartam:

12 nap

Lisztharmat

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: 10 %-os levéltömeg elérésétől (BBCH 41) 14 nappal betakarítás előtti állapotig

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Spenót és sóskában a permetezéseket a fertőzés helyzetétől függően maximum 3 alkalommal, 12-14 naponta, preventív módon kell elvégezni. A készítményt 400–600 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Peronoszpóra

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: 10 %-os levéltömeg elérésétől (BBCH 41) 14 nappal betakarítás előtti állapotig

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Spenót és sóskában a permetezéseket a fertőzés helyzetétől függően maximum 3 alkalommal, 12-14 naponta, preventív módon kell elvégezni. A készítményt 400–600 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Rozsda

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: 10 %-os levéltömeg elérésétől (BBCH 41) 14 nappal betakarítás előtti állapotig

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Spenót és sóskában a permetezéseket a fertőzés helyzetétől függően maximum 3 alkalommal, 12-14 naponta, preventív módon kell elvégezni. A készítményt 400–600 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Sütőtök (szabadföldi, hajtatott)

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. háromszor használható fel. Kijuttatás időpontja: első elsődleges oldalhajtás növekedésétől (BBCH 21) teljes érésig (BBCH 89).

Kezelések közötti min. időtartam:

10 nap

Kladospóriumos betegség

Dózis: 0,8–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: első elsődleges oldalhajtás növekedésétől (BBCH 21) teljes érésig (BBCH 89)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 3 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Sárgadinnyében, cukkiniben, sütőtökben és spárgatökben a készítményt a betegségek ellen megelőző jelleggel, más gombaölő szerekkel váltogatva kell felhasználni. A készítményt 500–800 l/ha (szabadföldi), 500–1200 l/ha (hajtatott) lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Lisztharmat

Dózis: 0,8–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: első elsődleges oldalhajtás növekedésétől (BBCH 21) teljes érésig (BBCH 89)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 3 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Sárgadinnyében, cukkiniben, sütőtökben és spárgatökben a készítményt a betegségek ellen megelőző jelleggel, más gombaölő szerekkel váltogatva kell felhasználni. A készítményt 500–800 l/ha (szabadföldi), 500–1200 l/ha (hajtatott) lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Peronoszpóra

Dózis: 0,8–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: első elsődleges oldalhajtás növekedésétől (BBCH 21) teljes érésig (BBCH 89)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 3 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Sárgadinnyében, cukkiniben, sütőtökben és spárgatökben a készítményt a betegségek ellen megelőző jelleggel, más gombaölő szerekkel váltogatva kell felhasználni. A készítményt 500–800 l/ha (szabadföldi), 500–1200 l/ha (hajtatott) lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Torma

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. háromszor használható fel. Kijuttatás időpontja: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) 80%-os gyökérvastagság eléréséig (BBCH 48).

Kezelések közötti min. időtartam:

14 nap

Albugós betegség

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) 80%-os gyökérvastagság eléréséig (BBCH 48)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 21 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Torma gombás betegségei ellen a növényvédő szert előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel kell kijuttatni. A permetezés szükség esetén 14 nap múlva megismételhető. A készítményt 400–600 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Cerkospóra

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) 80%-os gyökérvastagság eléréséig (BBCH 48)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 21 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Torma gombás betegségei ellen a növényvédő szert előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel kell kijuttatni. A permetezés szükség esetén 14 nap múlva megismételhető. A készítményt 400–600 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Lisztharmat

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) 80%-os gyökérvastagság eléréséig (BBCH 48)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 21 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Torma gombás betegségei ellen a növényvédő szert előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel kell kijuttatni. A permetezés szükség esetén 14 nap múlva megismételhető. A készítményt 400–600 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Tárkony

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. kétszer használható fel. Kijuttatás időpontja: négyleveles állapottól (BBCH 14) 14 nappal betakarítás előtti állapotig. Kiskultúrás felhasználások a 1107/2009 EK rendelet 51. cikke alapján. A felhasználások nincsenek alátámasztva dél-keleti EPPO zónás biológiai hatékonysági és a kultúrnövényre szelektivitási vizsgálatokkal. A készítmény kijuttatása ezekben a kultúrákban kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.

Kezelések közötti min. időtartam:

14 nap

Fómás betegség

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: négyleveles állapottól (BBCH 14) 14 nappal betakarítás előtti állapotig

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Gyógy- és fűszernövényekben (macskagyökér, kamilla, orvosi csucsor, körömvirág, orbáncfű, máriatövis, levendula, gyapjas gyűszűvirág, cickafark, vasfű, konyhakömény, ánizs, tárkony) peronoszpóra, lisztharmat, rozsda, fehérpenész, valamint az alternáriás-, szeptóriás- és fómás betegségek ellen a gombaölő szert megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell felhasználni.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Lisztharmat

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: négyleveles állapottól (BBCH 14) 14 nappal betakarítás előtti állapotig

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Gyógy- és fűszernövényekben (macskagyökér, kamilla, orvosi csucsor, körömvirág, orbáncfű, máriatövis, levendula, gyapjas gyűszűvirág, cickafark, vasfű, konyhakömény, ánizs, tárkony) peronoszpóra, lisztharmat, rozsda, fehérpenész, valamint az alternáriás-, szeptóriás- és fómás betegségek ellen a gombaölő szert megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell felhasználni.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Rozsda

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: négyleveles állapottól (BBCH 14) 14 nappal betakarítás előtti állapotig

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Gyógy- és fűszernövényekben (macskagyökér, kamilla, orvosi csucsor, körömvirág, orbáncfű, máriatövis, levendula, gyapjas gyűszűvirág, cickafark, vasfű, konyhakömény, ánizs, tárkony) peronoszpóra, lisztharmat, rozsda, fehérpenész, valamint az alternáriás-, szeptóriás- és fómás betegségek ellen a gombaölő szert megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell felhasználni.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Szeptóriás betegség

Dózis: 0,6-1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: négyleveles állapottól (BBCH 14) 14 nappal betakarítás előtti állapotig

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Gyógy- és fűszernövényekben (macskagyökér, kamilla, orvosi csucsor, körömvirág, orbáncfű, máriatövis, levendula, gyapjas gyűszűvirág, cickafark, vasfű, konyhakömény, ánizs, tárkony) peronoszpóra, lisztharmat, rozsda, fehérpenész, valamint az alternáriás-, szeptóriás- és fómás betegségek ellen a gombaölő szert megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell felhasználni.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Vajrépa

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. kétszer használható fel. Kijuttatás időpontja: Gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49). Kiskultúrás felhasználások a 1107/2009 EK rendelet 51. cikke alapján. A felhasználások nincsenek alátámasztva dél-keleti EPPO zónás biológiai hatékonysági és a kultúrnövényre szelektivitási vizsgálatokkal. A készítmény kijuttatása ezekben a kultúrákban kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.

Kezelések közötti min. időtartam:

14 nap

Albugós betegség

Dózis: 0,6 - 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: Gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Gyökérzöldségekben és vajrépában a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Alternáriás betegség

Dózis: 0,6 - 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: Gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Gyökérzöldségekben és vajrépában a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Lisztharmat

Dózis: 0,6 - 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: Gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Gyökérzöldségekben és vajrépában a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Szklerotíniás betegség (fehérpenész)

Dózis: 0,6 - 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: Gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Gyökérzöldségekben és vajrépában a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Vöröshagyma

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. kétszer használható fel. Kijuttatás időpontja: négyleveles állapottól (BBCH 14) 50 %-os fejátmérő eléréséig (BBCH 45).

Kezelések közötti min. időtartam:

14 nap

Alternária

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: négyleveles állapottól (BBCH 14) 50 %-os fejátmérő eléréséig (BBCH 45)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Hagymafélékben peronoszpóra, alternária és szürkepenész ellen a permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű megkezdeni, majd a fertőzés erősségétől függően 14 nap elteltével megismételni. A készítményt 400–600 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Peronoszpóra

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: négyleveles állapottól (BBCH 14) 50 %-os fejátmérő eléréséig (BBCH 45)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Hagymafélékben peronoszpóra, alternária és szürkepenész ellen a permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű megkezdeni, majd a fertőzés erősségétől függően 14 nap elteltével megismételni. A készítményt 400–600 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Szürkepenész (Botrytis cinerea)

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: négyleveles állapottól (BBCH 14) 50 %-os fejátmérő eléréséig (BBCH 45)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Hagymafélékben peronoszpóra, alternária és szürkepenész ellen a permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű megkezdeni, majd a fertőzés erősségétől függően 14 nap elteltével megismételni. A készítményt 400–600 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Zellergumó

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. kétszer használható fel. Kijuttatás időpontja: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49).

Kezelések közötti min. időtartam:

14 nap

Alternáriás betegség

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Gyökérzöldségekben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Lisztharmat

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Gyökérzöldségekben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Peronoszpóra

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Gyökérzöldségekben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Rozsda

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Gyökérzöldségekben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Szeptóriás betegség

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Gyökérzöldségekben a fertőzés észlelésétől 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel juttassuk ki a készítményt.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Zellerlevél

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. kétszer használható fel. Kijuttatás időpontja: 10 %-os levéltömeg elérésétől (BBCH 41) 80 %-os levéltömeg eléréséig (BBCH 48).

Kezelések közötti min. időtartam:

14 nap

Fehérpenész

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: 10 %-os levéltömeg elérésétől (BBCH 41) 80 %-os levéltömeg eléréséig (BBCH 48)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Levélpetrezselyemben, levélzellerben, kaporban és korianderben a permetezéseket megelőző jelleggel, vagy az első tünetek megjelenésekor kell elkezdeni. A kezeléseket 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel kell elvégezni. A készítményt 400–600 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Lisztharmat

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: 10 %-os levéltömeg elérésétől (BBCH 41) 80 %-os levéltömeg eléréséig (BBCH 48)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Levélpetrezselyemben, levélzellerben, kaporban és korianderben a permetezéseket megelőző jelleggel, vagy az első tünetek megjelenésekor kell elkezdeni. A kezeléseket 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel kell elvégezni. A készítményt 400–600 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Peronoszpóra

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: 10 %-os levéltömeg elérésétől (BBCH 41) 80 %-os levéltömeg eléréséig (BBCH 48)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Levélpetrezselyemben, levélzellerben, kaporban és korianderben a permetezéseket megelőző jelleggel, vagy az első tünetek megjelenésekor kell elkezdeni. A kezeléseket 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel kell elvégezni. A készítményt 400–600 l/ha lémennyiséggel juttassuk

ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Szeptóriás betegség

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: 10 %-os levéltömeg elérésétől (BBCH 41) 80 %-os levéltömeg eléréséig (BBCH 48)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Levélpetrezselyemben, levélzellerben, kaporban és korianderben a permetezéseket megelőző jelleggel, vagy az első tünetek megjelenésekor kell elkezdeni. A kezeléseket 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel kell elvégezni. A készítményt 400–600 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Szürkepenész (Botrytis cinerea)

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 2

Utolsó felhasználás fenológia szerint: 10 %-os levéltömeg elérésétől (BBCH 41) 80 %-os levéltömeg eléréséig (BBCH 48)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Levélpetrezselyemben, levélzellerben, kaporban és korianderben a permetezéseket megelőző jelleggel, vagy az első tünetek megjelenésekor kell elkezdeni. A kezeléseket 14 naponta, 400-600 l/ha vízmennyiséggel kell elvégezni. A készítményt 400–600 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Zöldborsó

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: első virágszirmok láthatóvá válásától (BBCH 59) a végleges nagyságú hüvelyek 70%-os arányának eléréséig (BBCH 77).

Kezelések közötti min. időtartam:

-

Aszkohitás betegség

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): egy kezelés engedélyezett

Utolsó felhasználás fenológia szerint: első virágszirmok láthatóvá válásától (BBCH 59) a végleges nagyságú hüvelyek 70%-os arányának eléréséig (BBCH 77)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Zöldborsóban lisztharmat, peronoszpóra, aszkohitás betegség és rozsda ellen a kezelést preventív módon, virágzás körül ajánlott elvégezni. A készítményt 400–600 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Lisztharmat

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): egy kezelés engedélyezett

Utolsó felhasználás fenológia szerint: első virágszirmok láthatóvá válásától (BBCH 59) a végleges nagyságú hüvelyek 70%-os arányának eléréséig (BBCH 77)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Zöldborsóban lisztharmat, peronoszpóra, aszkohitás betegség és rozsda ellen a kezelést preventív módon, virágzás körül ajánlott elvégezni. A készítményt 400–600 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Rozsda

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): egy kezelés engedélyezett

Utolsó felhasználás fenológia szerint: első virágszirmok láthatóvá válásától (BBCH 59) a végleges nagyságú hüvelyek 70%-os arányának eléréséig (BBCH 77)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Zöldborsóban lisztharmat, peronoszpóra, aszkohitás betegség és rozsda ellen a kezelést preventív módon, virágzás körül ajánlott elvégezni. A készítményt 400–600 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Édesburgonya

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: virágzás kezdetétől (BBCH 61) a gumónövekedés végéig (BBCH 49)

Kezelések közötti min. időtartam:

-

Lisztharmat

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): egy kezelés engedélyezett

Utolsó felhasználás fenológia szerint: virágzás kezdetétől (BBCH 61)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Édesburgonyában lisztharmat ellen a kezelést megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor javasolt elvégezni. A készítményt 300–600 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Édeskömény

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. háromszor használható fel. Kijuttatás időpontja: szárbaindulás kezdetétől (BBCH 30) 14 nappal betakarítás előtti állapotig.

Kezelések közötti min. időtartam:

12 nap

Lisztharmat

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: szárbaindulás kezdetétől (BBCH 30) 14 nappal betakarítás előtti állapotig

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Édesköménÿben a permetezéseket előrejelzésre alapozva preventív módon kell elvégezni az említett gombás betegségek ellen 300-600 l/ha lémennyiséggel.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Passzalórás betegség

Dózis: 0,6–1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: szárbaindulás kezdetétől (BBCH 30) 14 nappal betakarítás előtti állapotig

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Édesköménÿben a permetezéseket előrejelzésre alapozva preventív módon kell elvégezni az említett gombás betegségek ellen 300-600 l/ha lémennyiséggel.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Újhagyma (szabadföldi)

Kijuttatási időpont:

Egy tenyészidőszakban max. háromszor használható fel. Kijuttatás időpontja: négyleveles állapottól (BBCH 14) 50 %-os fejátmérő eléréséig (BBCH 45).

Kezelések közötti min. időtartam:

14 nap

Alternária

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: négyleveles állapottól (BBCH 14) 50 %-os fejátmérő eléréséig (BBCH 45)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 7 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Hagymafélékben peronoszpóra, alternária és szürkepenész ellen a permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű megkezdeni, majd a fertőzés erősségétől függően 14 nap elteltével megismételni. A készítményt 300–600 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Hagymarozsda

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: négyleveles állapottól (BBCH 14) 50 %-os fejátmérő eléréséig (BBCH 45)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 7 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Hagymafélékben peronoszpóra, alternária és szürkepenész ellen a permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű megkezdeni, majd a fertőzés erősségétől függően 14 nap elteltével megismételni. A készítményt 300–600 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Peronoszpóra

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: négyleveles állapottól (BBCH 14) 50 %-os fejátmérő eléréséig (BBCH 45)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 7 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Hagymafélékben peronoszpóra, alternária és szürkepenész ellen a permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű megkezdeni, majd a fertőzés erősségétől függően 14 nap elteltével megismételni. A készítményt 300–600 l/ha

lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Szürkepenész (Botrytis cinerea)

Dózis: 1,0 l/ha

Kezelések száma (max): 3

Utolsó felhasználás fenológia szerint: négyleveles állapottól (BBCH 14) 50 %-os fejátmérő eléréséig (BBCH 45)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 7 nap

Puffer zóna: 50 m

Megjegyzések: Hagymafélékben peronoszpóra, alternária és szürkepenész ellen a permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű megkezdeni, majd a fertőzés erősségétől függően 14 nap elteltével megismételni. A készítményt 300–600 l/ha lémennyiséggel juttassuk ki.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Munkavédelmi és biztonsági előírások

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)	   GHS07 GHS08 GHS09
Figyelmeztetés	Figyelem
Különleges S-mondatok	SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést! Spe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 méter távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!
Figyelmeztető mondatok (H-mondat)	H302 Lenyelve ártalmas.H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H332 Belélegezve ártalmas.H351 Feltehetően rákot okoz. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)	P102 Gyerekektől elzárva tartandó. P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. P261 Kerülje a permet belélegzését. P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. P405 Elzárva tárolandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: hulladékkezelési tervnek megfelelően.
Egyéb környezetvédelmi előírások	Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható. Nem alkalmazható fokozottan érzékeny felszín alatti vízvédelmi területen.
Egyéni védőfelszerelés	Előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha, arcvédő, védőlábbeli Kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha, FFP2 szűrőosztályú részecskeszűrő félálarc, védőlábbeli (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Veszélyhelyzet esetén

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.
Syngenta Kft. magyarországi információs vonal: 06/1/488 2288
Syngenta hot line: 00/44/1484/538 444
Közlekedési baleset esetén a KRESZ előírásai szerint kell eljárni, szükség esetén hívja a 112 segélyhívó számot.